



# MELAVITE GL80

**Glicerines folyékony kiegészítő  
takarmány, kérődzők részére.**

## ALKALMAZÁSA:

Kérődzők takarmányozásában a fejadagok energiakonzentrációjának növelésére, valamint az ellés körül kialakuló egyes anyagforgalmi betegségek megelőzésére, kezelésére; a laktáció korai szakaszában jelentkező energiahiány kompenzálására.

Tejlő teheneknél: Laktáció során, de különösképpen a laktáció első harmadában tömegtakarmányra (esetleg szénára) locsolva.

Hízómarha, juh, kecske: Tömegtakarmányra (esetleg szénára) locsolva.

### A termék beltartalmi jellemzői

|  | Eredeti anyagban | 100% száraz anyagban |
|--|------------------|----------------------|
| Glicerín tartalom  | min. 80,0%       | min. 93%             |
| Nedvesség tartalom   | max. 15,0%       |                      |
| Hamu   | max. 6,0%        | max. 7,0%            |
| MONG (egyéb, nem-glicerín szerves anyag)100%-glicerín-nedvesség-metanol- | max. 4,0%        | max. 3,5%            |
| Metil-alkohol  | max. 0,5%        | max. 0,6%            |

### Egyéb jellemző beltartalmi értékek

|     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| ME  | 17,21MJ/kgsza        |  |
| NEm | 12,181 MJ/gsza       |  |
| NEg | 8,769 MJ/kgsza       |  |
| NEI | 9,7 MJ/kgsza         |  |
| K   | 0,01-0,02 % / er.a.  |  |
| Na  | 1,8-1,9 % / er.a.    |  |
| Ca  | 0,10 % / er.a.       |  |
| Mg  | 0,01 % / er.a.       |  |
| S   | 300-400 mg/kg er.a.  |  |
| P   | 100-200 mg/kg er. a. |  |

## ADAGOLÁS:

Szarvasmarha: 300 gramm/állat/nap

## TÁROLÁS:

Száraz, hűvös helyen, zárt tartályban.